Kommunikative Umgebungen und Strategien: was benötigen wir für eine gute Entscheidung?

Christiane Muth

5. arriba-SYMPOSIUM, Berlin, 1. April 2022

Interessenkonflikte

Herausgeberschaft mit
Unter Mitwirkung von
39 (inter-)nationalen Autor*innen
und einem belgischen Karikaturisten

- **Keine Verflechtungen** mit der Pharmaindustrie oder Herstellern von medizinischen Geräten

Evidenzbasierte Entscheidungsfindung

Ursprüngliche Idee der EbM hatte 3 Säulen¹

- häufig reduziert auf externe Evidenz:
Bsp. AWMF-Wording bei Empfehlungen
„sollen/sollten/können erhalten“
Erst seit kurzem:
„sollen/sollten/können angeboten bekommen“
- Methoden der EbM fokussiert auf
Evidenzbewertung,
wenig zur Integration von klinischer Expertise
und zu Patientenpräferenzen

[1] Sackett et al. BMJ 1996;312(7023):71-2.

Multimorbidität erhöht die Komplexität der Entscheidungsfindung

- ~ 80% der hausärztlichen Konsultationen mit multimorbiden Patient*innen ^[1] → ***“To neglect does not help”***
- Aktuelle (krankheitszentrierte) Leitlinien berücksichtigen MM nicht ausreichend :
Unkritische Anwendung multipler krankheitsorientierter Leitlinien bei einem multimorbiden Patienten
→ **Interaktionen, Multimedikation**^[2] (bspw. **“therapeutischer Reflex”** nach “labelling” von Diagnosen^[3])
- Konsultationen meist im ‘additiv-sequentiellen Modus’^[4] (d.h. “muddling through”)

[1] Salisbury et al. Br J Gen Pract 2011;61(582):e12-e21; [2] Boyd et al., JAMA 2005;294(6):716-24; [3] Glasziou <https://blogs.bmj.com/bmj/2013/07/22/paul-glasziou-beware-the-hyperactive-therapeutic-reflex/>; [4] Bower et al. Fam Pract 2011; 28:579–587

Fallbeispiel: Herr M, 72 Jahre:[1]

- Erhebliche Presbyakusis
- Benigne Prostatahypertrophie
- M. Parkinson
- Aktuell: rezidivierende Gingivitis und Kariesprobleme

Scenario 1: Parkinson-Symptomatik hat sich über die letzten Monate deutlich verschlechtert (eingeschränkte Mobilität, Sturzneigung)

[1] Pers. Komm. Prof. Paul Glasziou, Prof. Ulrich Thiem

Fallbeispiel: Herr M, 72 Jahre:

- Erhebliche Presbyakusis
- Benigne Prostatahypertrophie
- M. Parkinson
- Aktuell: rezidivierende Gingivitis und Kariesprobleme

Scenario 2: Ehefrau verstarb vor 3 Jahren, Pat. lebt allein und hat bislang unerkannte Parkinson-assoziierte Demenz mit Einschränkung aller (instrumentellen) Aktivitäten des tägl. Lebens aufgrund kognitiver Dysfunktion

Fallbeispiel: Herr M, 72 Jahre:

- Erhebliche Presbyakusis
- Benigne Prostatahypertrophie
- M. Parkinson
- Aktuell: rezidivierende Gingivitis und Kariesprobleme

Scenario 3: Patient leidet unter oralen Beschwerden und Schmerzen, besonders beim Essen u. Trinken; wünscht Beschwerdelinderung, Mundtrockenheit wird als quälend empfunden

Fallbeispiel: Herr M, 72 Jahre – Behandlungsoptionen:^[1]

- Erhebliche Presbyakusis
- Benigne Prostatahypertrophie
- M. Parkinson
- Aktuell: rezidivierende Gingivitis und Kariesprobleme

- Scenario 1 (Parkinson-Verschlechterung): Intensivierung der Therapie
- Scenario 2 (soziales Umfeld, Demenz): vorw. psycho-soziale Intervention
- Scenario 3 (trockener Mund): Verbesserung der Mundhygiene (z.B. elektrische Zahnbürste), ggf. De-Intensivierung der Anti-Parkinson-Therapie

[1] Pers. Komm. Prof. Paul Glasziou, Prof. Ulrich Thiem

Patientenzentrierte Entscheidungsfindung bei Multimorbidität

Ariadne-Prinzipien¹ für Konsultationen mit multimorbiden Patienten in der Hausarztpraxis (Multi-Konsultationsmodell):

- **Interaktionsbewertung:** Konditionen, Konstitution, Behandlung des Patienten und (psychosozialer) Kontext
- **Patientenpräferenzen erheben, Prioritäten setzen** u. realistische **Behandlungsziele vereinbaren**
- **Individualisierung des Vorgehens** (Diagnostik, Therapie, Prävention), um die vereinbarten Ziele zu erreichen
- **Überprüfung der Zielerreichung** sowie ggf. unerwarteter Effekte in Folgekontakten

[1] Muth & van den Akker et al. BMC Med. 2014;12:223. [2] Leiva-Fernández et al. Mech Ageing Dev. 2020;192:111354

Patientenzentrierte Entscheidungsfindung bei Multimorbidität

Ariadne-Prinzipien¹ für Konsultationen mit multimorbiden Patienten in der Hausarztpraxis (Multi-Konsultationsmodell):

- **Interaktionsbewertung:** Konditionen, Konstitution, Behandlung des Patienten und (psychosozialer) Kontext
- **Patientenpräferenzen erheben, Prioritäten setzen u. realistische Behandlungsziele vereinbaren**
- **Individualisierung des Vorgehens** (Diagnostik, Therapie, Prävention), um die vereinbarten Ziele zu erreichen
- **Überprüfung der Zielerreichung** sowie ggf. unerwarteter Effekte in Folgekontakten

[1] Muth & van den Akker et al. BMC Med. 2014;12:223. [2] Leiva-Fernández et al. Mech Ageing Dev. 2020;192:111354

Patientenpräferenzen „erheben“?

- GRADE working group definiert Präferenzen als Entscheidungen, die Patienten treffen ‘considering the potential benefits, harms, costs, limitations and inconveniences of the management options in relation to one another’.¹

[1] Andrews et al. *J Clin Epidemiol* 2013;66:726–35.

Patientenpräferenzen „erheben“? – Ein Rückgriff auf Entscheidungstheorien

Rational Choice Theory: Individuen treffen rationale Entscheidungen zwischen verschiedenen Alternativen auf der Basis konsistenter Präferenzen, um möglichst beste Ergebnisse zu erzielen:

	<i>homo oeconomicus</i>	<i>Prospect-Theorie</i>	<i>Bounded Rationality</i>
Zieldefinition	Nutzen	Erwartungen	Nutzenmaximierung unter Einschränkungen
Entscheidungsregeln	Zielmaximierung		Auswahl befriedigender Alternativen („Satisfazierung“) Heuristiken*
Informiertheit	Vollständige Kenntnis der Alternativen	Entscheidungen unter Unsicherheit	
Objektivität	objektive Rationalität ist Voraussetzung		Berücksichtigung subjektiven Handelns

*Heuristiken (Goldstein und Gigerenzer, 1999): Theorie des „Ignoranzbasierten Entscheidens“, bei der eine Wiedererkennung die Wahl bestimmt und zu schnellen und befriedigenden Entscheidungen führt.

Patientenpräferenzen „erheben“?

- GRADE working group definiert Präferenzen als Entscheidungen, die Patienten treffen ‘considering the potential benefits, harms, costs, limitations and inconveniences of the management options in relation to one another’.¹
- Präferenzen umfassen auch Überzeugungen, Erwartungen, Wünsche, Perspektiven und Ziele!
- „Angeborene“ Präferenzen (z.B. Schmerzvermeidung) vs. erworbene / erlernte Präferenzen
- Patientenpräferenzen in medizinischen Entscheidungssituationen: müssen i.d.R. „konstruiert“ werden²

[1] Andrews et al. *J Clin Epidemiol* 2013;66:726–35. [2] Lichtenstein S, Slovic P. *The construction of preference*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006.

Patientenpräferenzen „erheben“? – Einfluss des Interpretationsrahmens¹

Kahneman und Tversky (Prospect-Theorie): Individuen bewerten Alternativen abhängig vom Interpretationsrahmen (*Framing*)

- Unterbewertung von denjenigen Alternativen, die „wahrscheinlich“ eintreten, wenn gleichzeitig Alternativen präsentiert werden, die „gewiss“ eintreten (*certainty effect*)
 - Ausblendung derjenigen Komponenten, die bei allen Alternativen auftreten (*isolation effect*)
- Inkonsistenz von Präferenzen

[1] Tversky, A.; Kahneman, D. The framing of decisions and the psychology of choice. Science 1981, 211, 453–458.

Patientenpräferenzen „erheben“?

- GRADE working group definiert Präferenzen als Entscheidungen, die Patienten treffen ‘considering the potential benefits, harms, costs, limitations and inconveniences of the management options in relation to one another’.¹
- Präferenzen umfassen auch Überzeugungen, Erwartungen, Wünsche, Perspektiven und Ziele!
- „Angeborene“ Präferenzen (z.B. Schmerzvermeidung) vs. erworbene / erlernte Präferenzen
- Patientenpräferenzen in medizinischen Entscheidungssituationen: müssen i.d.R. „konstruiert“ werden²
- Entscheidungen bei Multimorbidität:³
 - oft unter **Unsicherheit** (fehlende Evidenz),
 - Ggf. **trade-offs**: zum Erreichen eines Behandlungsziels müssen Einbußen an anderer Stelle hingenommen werden, wenn sich die gewählte Therapiealternative z.B. ungünstig auf eine andere Kondition auswirkt.

[1] Andrews et al. *J Clin Epidemiol* 2013;66:726–35. [2] Lichtenstein S, Slovic P. *The construction of preference*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006.

[3] González-González et al. *BMJ Open* 2019;9:e029724.

BMJ Open Health-related preferences of older patients with multimorbidity: an evidence map

Ana Isabel Gonzalez ^{1,2}, Christine Schmucker,³ Julia Nothacker,³ Edith Motschall,⁴ Truc Sophia Nguyen,¹ Maria-Sophie Brueckle,¹ Jeanet Blom,⁵ Marjan van den Akker,^{1,6} Kristian Röttger,⁷ Odette Wegwarth ⁸, Tammy Hoffmann,⁹ Sharon E Straus,¹⁰ Ferdinand M Gerlach,¹ Joerg J Meerpohl,³ Christiane Muth¹

- **Ziel:** Systematische Identifizierung von Wissensclustern und Forschungslücken bei gesundheitsbezogenen Präferenzen von älteren Patienten mit Multimorbidität durch Kartierung aktueller Evidenz
- **Methoden:** 7 Datenbanken (MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, PSYINDEX, CINAHL, Science Citation Index/Social Science Citation Index/-Expanded) bis 2018, Doppelreview, thematische Clusterung
- **Ergebnisse:** N=152 Studien, N=57 093 Patienten (Range 9–9105):
 - Setting: 62% Nordamerika, 28% Europa; 56% spezialisierte Versorgung, 36% Hausarztpraxen
 - Design: n=1 Intervention, n=151 Beobachtungsstudien (qualitative: 41%, quantitative: 57%)

Evidence map¹

[1] González-González *et al.* *BMJ Open* 2019;9:e034485.

Evidence map¹

Design:

- : Qualitative
- ⊘: Cross-sect.
- ⊚: Intervent.
- : Long.-observ
- : Mixed

Sample Size

[1] González-González et al. *BMJ Open* 2019;9:e034485.

Review

End-of-Life Care Preferences of Older Patients with Multimorbidity: A Mixed Methods Systematic Review

Ana I. González-González ^{1,2,*}, Christine Schmucker ³, Julia Nothacker ³, Edris Nury ³, Truc Sophia Dinh ¹, Maria-Sophie Brueckle ¹, Jeanet W. Blom ⁴, Marjan van den Akker ^{1,5,6}, Kristian Röttger ⁷, Odette Wegwarth ⁸, Tammy Hoffmann ⁹, Ferdinand M. Gerlach ¹, Sharon E. Straus ¹⁰, Joerg J. Meerpohl ^{3,11} and Christiane Muth ^{1,12}

- Definition E-o-L Care: i.d.R. letztes Lebensjahr
- **Ziel:** Bereitstellung von Entscheidungsunterstützung für *advanced care planing* in emotional schwieriger Situation
- **Methoden:** Datenbankrecherche; Einschluss qualitativer und quantitativer Studien zu E-o-L Präferenzen, Patient*innen ≥ 60 Jahre, ≥ 2 Krankheiten; Risk of Bias: Mixed Method Appraisal Tool (MMAT)¹; Datenextraktion; Synthese: konvergenter integrierter Ansatz (qual.: thematische Inhaltsanalyse, quant.: deskriptiv + Metaanalyse, Integration n. Joanna Briggs Institute-Ansatz²)

[1] Pluye & Hong. Annu. Rev. Public Health 2014, 35, 29–45. [2] Lizarondo et al. JBI Manual for Evidence Synthesis, Chapter 8. JBI, 2020. <https://synthesismanual.jbi.global>.

End-of-Life Care Präferenzen bei älteren Patient*innen mit Multimorbidität¹

- **N=22** Studien (N=3.243 Patient*innen, Range: 12-682)
 - **Region:** USA/CAN: **8**, NL: **5**, restl. Europa: **5**, Asien: **4** Studien
 - **Setting:** Spezialärztlich (ambulant u. stationär): **18**, Pflegeheim: **3**, Allgemeinmedizin: **1** Studie(n)
 - **Design:** qual / quant / mixed: **3 / 15 / 3**; davon longitudinale Beobachtungsstudien: **1**
 - **Kontext:** reales Szenario: **9**, hypothetisches Szenario: **6**, kombiniert: **7** Studien
 - **Population:** 58% Männer, Alter: 60-84 J.; Pat. mit MM: **9**, Pat. m. Indexerkrankung: **13** Studien
 - **RoB:** niedrig: 10, moderat: 1, hoch: 11 Studien (non-responder bias)
 - **Präferenzen:** (multiple E-o-L Care-Präferenzen: **16** Studien)
 - Bereitschaft, lebenserhaltende Behandlungen zu erhalten (allg., spezifisch: Beatmung, CPR, Bluttransfusion, Dialyseabbruch, Abbruch ICD-Behandlung): **19** Studien
 - Ort E-o-L Care: **6**, Einbezug in SDM über E-o-L Care: **8**, Wahlmöglichkeit für Symptompalliation: **6** Studien

[1] González-González et al. *J. Clin. Med.* 2020, 10, 91..

Bereitschaft, lebenserhaltende Behandlungen in verschiedenen Szenarien zu erhalten¹

WALT-Instrument (Willingness to Accept Life-Sustaining Treatment) zur Ermittlung der Präferenzen mit Bezug auf Eintrittswahrscheinlichkeit des Outcomes

△- Tod, ○- funktionelle Beeinträchtigung, □ - kognitive Beeinträchtigung

[1] González-González et al. J. Clin. Med. 2020, 10, 91..

Lebensverlängerung und *treatment burden*

■ - high treatment burden, □ - low treatment burden

Bereitschaft zur mechanischen Beatmung in Abhängigkeit zum Kontext¹

Study	Yes	Total	Prop	95%-CI
Real				
Fuseya 2019	10	160	0.06	[0.03; 0.11]
Janssen 2011	127	185	0.69	[0.61; 0.75]
Janssen 2012	156	206	0.76	[0.69; 0.81]
Janssen 2013b	65	80	0.81	[0.71; 0.89]
Parr 2010	23	126	0.18	[0.12; 0.26]
Nath 2008	10	18	0.56	[0.31; 0.78]
Random effects model		775	0.48	[0.21; 0.76]
Heterogeneity: $I^2 = 98\%$, $\tau^2 = 2.2603$, $p < 0.01$				
Hypothetical				
Carlucci 2016	12	43	0.28	[0.15; 0.44]
Random effects model		43	0.28	[0.17; 0.43]
Heterogeneity: not applicable				
Real + Hypothetical				
Lee 1992	71	100	0.71	[0.61; 0.80]
Random effects model		100	0.71	[0.61; 0.79]
Heterogeneity: not applicable				
Random effects model		918	0.48	[0.26; 0.71]
Heterogeneity: $I^2 = 97\%$, $\tau^2 = 1.8968$, $p < 0.01$				
Residual heterogeneity: $I^2 = 97\%$, $p < 0.01$

[1] González-González et al. J. Clin. Med. 2020, 10, 91..

Präferenzstabilität in E-o-L Care

- **Kontext:** Bereitschaft, lebenserhaltende Behandlungen zu erhalten, steigt häufig in realen Szenarien¹
- **Longitudinal:** > 1/3 der Patient*innen änderte Präferenz für lebenserhaltende Maßnahmen in 1 Jahr follow-up
ABER: signifikant höhere Präferenzstabilität bei Teilnahme in advanced care program¹
- **Morbiditätsstatus:** höhere Präferenzstabilität bei erwachsenen Krankenhauspatient*innen (80%)² und schwerkranken Patient*innen der ambulanten Versorgung (75%²...93%³) als bei multimorbiden Patient*innen (63%)²
- **Krankheitsschwere:** Mehrzahl der Patient*innen möchte E-o-L Care zu Hause erhalten – mit zunehmender Krankheitsschwere ändern bis zu 60% diese Präferenz (Krankenhaus, Hospiz)^{1,4}

[1] González-González *et al.* *J Clin Med* 2020, 10, 91; [2] Auriemma *et al.* *JAMA Intern Med* 2014, 174, 1085–1092.; [3] Emanuel *et al.* *Arch Intern Me.* 1994, 154, 209–217;

[4] Gomes *et al.* *BMC Palliat. Care* 2013, 12, 7.

Zwei letzte Beispiele: Unterstützung bei der Konstruktion von Präferenzen

- Entwicklung einer Reihe von einfachen visuellen Unterstützungen bei der Formulierung von Therapiezielen

Patientenpräferenzen & Therapieziele

6.1 Was sollen die Medikamente in Ihrer derzeitigen Lebenssituation bewirken?
 Benutzen Sie bitte für Frage 6.1 nur die blauen Kästchen. **Mehrfachantworten!**

☐	Eine Verlängerung des Lebens?	☐
☐	Weniger Krankenhausaufenthalte?	☐
☐	Weniger Schmerzen?	☐
☐	Bessere Bewältigung des Alltags (Einkaufen, etc.)?	☐
☐	Mehr Freude am Leben?	☐
☐	Andere: _____	☐

6.2 Was ist Ihnen davon das wichtigste?
 Benutzen Sie für die Antwort nun die gelben Kästchen von Frage 6.1.
Achtung: hier ist nur eine Antwort möglich!

Ausschnitt aus MediMoL (PRIMUM-Studie, D)^{1,2}

OPT-Tool (NL)^{3,4}

→ Einsatz machbar

[1] Muth et al. *BMJ Open*. 2016;6(7):e011613;

[2] Muth et al. *BMJ Open*. 2018;8(2):e017740;

[3] van Summeren et al. *J Am Geriatr Soc* 2016;

[4] Gomes et al. *Br J Gen Pract* 2017; DOI: <https://doi.org/10.3399/bjgp17X690485>.

Zusammenfassung

→ **Strukturiertes, proaktiv geplantes Vorgehen** anstelle von ‚muddling through‘

Gesundheitsbezogene **Präferenzen** mit Patient*innen „**konstruieren**“ zur gemeinsamen Abstimmung von **Therapiezielen**

in Behandlungsprozess longitudinal integrieren, um gute Entscheidungen für ein **Individualisiertes Management** zu treffen (ggf. Verwendung von Priorisierungstools)
konsequente **Nachverfolgung**